

INVENTARIZACE - POROSTNÍ SKUPINA

P.Č.	etáž	TAXONY zastoupení v rámci etáže v %	výška etáže (m)	plocha skupiny (m2)	POPIS STAVU	NÁVRH ZÁSAHU
P1	I.	-		1977		
	II.	Acer pseudoplatanus (60%) Quercus robur (20%) Aesculus hippocastanum (15%) Picea abies (5%)	25		Patro hlavní úrovně tvořené kosterními dřevinami věkové stádium 4 až 5. Většina stromů je vitální, případně s mírně sníženou vitalitou zdravotní stav je převážně dobrý. Část strašáků dubů a javorů je silně poškozená, objevují se výletové otvory, houbové infekce, narušení stability a postupný rozpad koruny. Podrobné hodnocení je uvedeno v části Inventarizace stromy.	pěstební ošetření dřevin a kácení dle podrobné inventarizace stromů
	III.	Acer pseudoplatanus (50%) Prunus avium (20%) Cornus sanguinea (10%) Corylus avellana (10%) Acer platanoides (10%)	8		Patro podúrovňových dřevin, druhově pestré, věkového stádia 3 a 4 s průměrem kmene 10 až 20cm. Zdravotní stav převážně dobrý, několik stromů má nevhodné větvení, část je poškozená vlivem hustého zápoje.	probírky náletů pozitivní výběr, probírky stromů Ø kmene do 20cm (cca 10ks), max 20%
	IV.	Cornus sanguinea (10%) Sambucus nigra (10%) Crataegus monogyna (5%) Corylus avellana (10%) Rubus fruticosus (5%) Prunus padus (5%) Taxus baccata (5%) Ribes sp.+ Rosa canina + nálety: 40% Fraxinus excelsior Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Prunus avium Quercus robur Malus sp.	4		Patro keřů a náletů s pokryvností cca 80%. Etáž tvořena převážně nálety dřevin domácí rušové skladby, z keřů dominuje svída, bez a líška, doplňkově je zastoupen hloh, střemcha a tis, ojediněle růže šípková, ostružiník a meruzalka. Bylinné patro zastoupeno lokálně na okraji porostu v podobě travinobylinné vegetace.	probírky porostu,ponechat keřové patro Probírky náletů v porostu max. 20%
pozn. Porostní skupina rostoucí v jihovýchodní části porostu z části na strmém svahu, z části na rovině nad asfaltovou komunikací. Převážnou část porostu tvoří nálety dřevin domácí druhové skladby. Patro hlavní úrovně tvoří kosterní dřeviny s dominantním javorem klenem, doplňkově dub letní, jírovec a vtroušeně smrk ztepilý. Keřové patro je zastoupeno ojediněle, tvořené bezem, svídou a lískou, doplňkově je zastoupen hloh, střemcha, tis a ostružiník, ojediněle růže šípková a meruzalka.						

P.Č.	etáž	TAXONY zastoupení v rámci etáže v %	výška etáže (m)	plocha skupiny (m2)	POPIS STAVU	NÁVRH ZÁSAHU
P2	I.	Acer pseudoplatanus (80%) Quercus robur (20%)	26	1490	Patro nadúrovňových dřevin tvořené převážně duby, věkového stadia 4 a 5. Vitalita i zdravotní stav jsou převážně zhoršené až silně narušené. U senescentních stromů se vyskytují rozsáhlé infekce kmene a koruny, časté jsou zlomy a mechanická poškození a výletové otvory. Některé stromy jsou havarijní. Podrobné hodnocení je uvedeno v části Inventarizace stromy.	pěstební ošetření dřevin a kácení dle podrobné inventarizace stromů
	II.	Acer pseudoplatanus (35%) Quercus robur (25%) Prunus avium (35%) Picea abies (5%)	18		Patro hlavní úrovně tvořené náletovými dřevinami věkové stádium 4, o průměru kmene 20-30cm, které rostou převážně v horní části svahu při okraji porostu. Většina stromů je vitální, případně s mírně sníženou vitalitou zdravotní stav je převážně dobrý u několika jedinců zhoršený vlivem hustého sponu s výskytem rozsáhlých infekcí kmene a nvhodným větvením.	kácení poškozených stromů, probírky stromů Ø kmene do 30cm (cca 10ks)
	III.	Acer pseudoplatanus (40%) Prunus avium (25%) Acer platanoides (20%) Fraxinus excelsior (5%) Prunus padus (5%) Corylus avellana (5%)	9		Patro podúrovňových dřevin, druhově pestré, věkového stadia 3 s průměrem kmene 10 až 20cm. Zdravotní stav převážně dobrý.	probírky náletů pozitivní výběr, uvolnění místa pro novou výsadbu kosterních dřevin, probírky stromů Ø kmene do 20cm, max 20%
	IV.	Sambucus nigra (25%) Corylus avellana (25%) Crataegus monogyna (10%) Cornus sanguinea (5%) Prunus padus (5%) Taxus baccata (5%) Rosa canina + Rubus fruticosus + nálety: 20% Fraxinus excelsior Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Prunus avium Tilia cordata Tilia platyphyllos	4		Patro keřů a náletů s pokryvností cca 50%. Etáž tvořena převážně nálety dřevin domácí ruhové skladby, z keřů dominuje líska, bez, doplňkově je zastoupen hloh, svída, střemcha a tis, ojediněle růže šípková a ostružiník. Bylinné patro je ochuzené, v podobě travinobylinné vegetace.	probírky porostu,ponechat keřové patro Probírky náletů v porostu max. 20%
pozn. Porostní skupina rostoucí v horní části příkřehého svahu nad lesní cestou tvořená převážně dorůstající etáží podúrovňových dřevin a náletů. V porostní skupině jsou zastoupena všechna patra vč. nadúrovňových dřevin. Ojediněle se v porostu vyskytují vzrostlé dřeviny samostatně nebo ve skupinách , tvořené zejména dubem letním a javorem klenem. Patro hlavní úrovně tvoří náletové dřeviny domácí druhové skladby s dominantním javorem klenem, třešní ptačí a dubem letním. Doplňkově je zastoupen smrk ztepilý. Keřové patro je zastoupeno ojediněle, tvořené bezem, hlohem a lískou, doplňkově je zastoupen svída, střemcha, tis a ostružiník, ojediněle růže šípková.						

P.Č.	etáž	TAXONY zastoupení v rámci etáže v %	výška etáže (m)	plocha skupiny (m2)	POPIS STAVU	NÁVRH ZÁSAHU
P3	I.	Acer pseudoplatanus (50%) Quercus robur (40%) Aesculus hippocastanum (10%)	26	1553	Patro nadúrovňových dřevin tvořené dubem letním a javorem klenem, věkového stadia 4 a 5. Vitalita i zdravotní stav jsou převážně zhoršené až silně narušené. U senescentních stromů se vyskytují rozsáhlé infekce kmene a koruny, časté jsou zlomy a mechanická poškození a výletové otvory. Některé stromy jsou havarijní. Podrobné hodnocení je uvedeno v části Inventarizace stromy.	pěstební ošetření dřevin a kácení dle podrobné inventarizace stromů
	II.	Picea abies (40%) Acer pseudoplatanus (30%) Quercus robur (25%) Prunus avium (5%)	20		Patro hlavní úrovně tvořené kosterními dřevinami věkové stádium 4. Většina stromů je vitální, případně s mírně sníženou vitalitou, zdravotní stav je převážně dobrý. Ojedinelé je zastoupena suchá třešeň, lokálně jsou zastoupeny stromy s tlakovým větvením, infekcí kmene a suchými větvemi.	kácení poškozených a suchých stromů, probírky stromů Ø kmene 30-40cm (5ks)
	III.	Acer pseudoplatanus (25%) Prunus avium (20%) Quercus robur (20%) Prunus domestica (5%) Prunus insititia (5%) Acer platanoides (25%)	10		Patro podúrovňových dřevin, druhově pestré, věkového stadia 3 s průměrem kmene 10 až 20cm. Zdravotní stav převážně dobrý, několik stromů má nevhodné větvení, část je poškozená vlivem hustého zápoje.	probírky náletů pozitivní výběr, odstranit suché a poškozené, probírky stromů Ø kmene do 20cm, max 20%
	IV.	Corylus avellana (20%) Sambucus nigra (10%) Crataegus monogyna (10%) Rubus fruticosus (5%) Taxus baccata (5%) nálety: 50% Fraxinus excelsior Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Prunus avium Quercus robur Tilia cordata Crataegus monogyna Prunus insititia	5		Patro keřů a náletů s pokryvností cca 60%. Etáž tvořena převážně nálety dřevin domácí ruhové skladby, z keřů dominuje líska, bez a hloh, doplňkově je zastoupen tis a ostružiník. Bylinné patro zastoupeno v západní rozvolněné části porostu v podobě traviunobylinné vegetace.	probírky porostu,ponechat keřové patro Probírky náletů v porostu max. 20%
pozn. Porostní skupina rostoucí na svahu mezi dvěma lesními pěšinami. Východní část porostní skupiny tvoří kosterní dominantní dřeviny hlavní úrovně a dřeviny nadúrovňové tvořené převážně javorem klenem, dubem letním a smrkem ztepilým, doplňkově je zastoupena třešeň ptačí a jírovec. Západní část, kde bývaly spíše sady, je tvořena zejména dorůstajícími dřevinami podúrovňových náletových dřevin se zastoupením javorů, dubů a také ovocných dřevin. Lokálně jsou v porostu zastoupeny také staré pařezy po odstraněných kosterních dubech. V podrostu opět dominují nálety domácích dřevin a z části je zastoupeno také keřové patro s lískou, bezem a hlohem.						

P.Č.	etáž	TAXONY zastoupení v rámci etáže v %	výška etáže (m)	plocha skupiny (m2)	POPIS STAVU	NÁVRH ZÁSAHU
P4	I.	Quercus robur (100%)	25	979	Patro nadúrovňových dřevin tvořené dubem letním věkového stadia 4 a 4-5. Vitalita stromů je mírně snižená, zdravotní stav je u jednoho z jedinců silně narušený. U senescentních stromů se vyskytují rozsáhlé infekce kmene a koruny, časté jsou zlomy a mechanická poškození. Některé stromy jsou havarijní. Podrobné hodnocení je uvedeno v části Inventarizace stromy.	pěstební ošetření dřevin a kácení dle podrobné inventarizace stromů
	II.	Acer platanoides (30%) Quercus robur (30%) Acer pseudoplatanus (25%) Betula pendula (5%) Prunus avium (10%)	12		Patro hlavní úrovně tvořené dubem letním, javorem klenem a mléčem, doplňkově třešní ptačí a břízou bělokorou, věkového stadia 3 a 4 s průměrem kmene 10 až 30cm. Většina stromů je vitální, případně s mírně sníženou vitalitou zdravotní stav je převážně dobrý. U několika jedinců jsou defektní větvení, mechanické poškození a houbové infekce.	probírky náletů pozitivní výběr, odstranit suché a poškozené, probírky stromů Ø kmene do 20cm, max 10%
	III.	Corylus avellana (50%) Acer platanoides (25%) Acer pseudoplatanus (20%) Crataegus monogyna (5%) Prunus insititia + Carpinus betulus +	8		Patro podúrovňových dřevin, druhově pestré, věkového stadia 3 s průměrem kmene do 10cm.Výrazně se uplatňují keřové lísky. Zdravotní stav převážně dobrý.	probírky náletů pozitivní výběr, odstranit suché a poškozené, probírky stromů Ø kmene do 10cm, max 10%
	IV.	Corylus avellana (20%) Cornus sanguinea (5%) Crataegus monogyna (5%) Rubus fruticosus + Rosa canina + nálety: 70% Fraxinus excelsior Acer platanoides Acer pseudoplatanus Carpinus betulus Prunus avium Quercus robur Quercus petraea Malus sp. Prunus insititia Sorbus aucuparia	4		Patro keřů a náletů s pokryvností cca 90%. Etáž tvořena převážně nálety dřevin domácí ruňové skladby, z keřů dominuje líska, doplňkově je zastoupen hloh, svída, ojediněle růže šípová a ostružiník. Bylinné patro zastoupeno lokálně na okraji porostu v podobě travinobylinné vegetace.	probírky porostu,ponechat keřové patro Probírky náletů v porostu max. 20%
pozn. Porostní skupina rostoucí v jihozápadní části na úpatí svahu mezi lesní pěšinou a asfaltovou komunikací s odvodňovacím žlabem. V porostu převládají keře a nálety domácích dřevin, které tvoří také hlavní úroveň. Nadúrovňové dřeviny jsou zastoupeny dvojicí dubů ve východní části porostní skupiny. Keřové patro je v západní části zastoupeno zejména lískami, s příměsí hlohu, slivoní. V podrostu opět dominují nálety domácích dřevin.						